

Le cygne noir



© Jean-Michel Peers

Vol :

Le cygne noir est nomade et doté d'un vol puissant. Il peut aisément survoler les terres et sait faire étape sur les lacs ou les zones de culture inondées.

Habitat :

Le cygne noir est un oiseau répandu, capable de vivre dans presque tous les milieux humides. Lors de la saison de nidification, on le trouve surtout sur les grands lacs peu profonds, ou à proximité. Le reste de l'année, il fréquente aussi de petits étangs stagnants isolés, des baies abritées ou des lagunes côtières saumâtres.

Alimentation :

Le cygne noir ne se nourrit que de végétaux et ne capture insectes et autres invertébrés que par hasard. Il mange surtout en nageant en immergeant la tête et le cou pour atteindre les plantes sous la surface. En eau plus profonde, le cygne noir peut aussi basculer le corps, queue pointée en l'air et le cou étendu au maximum pour augmenter ses possibilités. Toutes sortes de végétaux sont consommés dont les lentilles d'eau et des algues. On voit souvent le cygne noir pâture à l'intérieur des terres, loin de l'eau, poussé par son goût pour les céréales cultivées

Mâle et femelle adulte :

Plumage noir
Plumes du dos retroussées
Bec rouge avec une barre blanche au bout
Le bout des ailes est blanc (visible en vol)
Pattes noires
Yeux rouge

Bébés :

Plumage gris
Bec gris foncé
Pattes grises

Famille : Anatidés
Taille : 112 à 140 cm
Envergure : 183 cm
Poids : mâle: 6 Kg
 femelle : 5 Kg
Longévité : 20 ans



<http://www.tlqg.fr/les-cygnes>

Nidification :

La période de reproduction du cygne noir correspond en général avec la saison des pluies. L'espèce construit un gros nid d'ordinaire sur la terre ferme mais toujours près de l'eau. Parfois, le nid est installé dans les marais ou même sur un radeau de débris végétaux. Contrairement aux autres cygnes, le cygne noir est étonnamment tolérant à l'égard de ses congénères. Sur des petites îles, il peut exister des colonies de nidification où les nids se touchent presque. Le premier œuf vert pâle est pondu dès le début de l'édification du nid, puis 4 ou 5 autres viennent peu après. Les deux adultes se relaient pour couvrir durant six semaines. L'incubation ne commence qu'une fois la ponte complète ou presque, et les petits cygnes éclosent ainsi tous en deux ou trois jours.