

Le martin pêcheur

Mâle et femelle adulte :

Un front, un capuchon, une nuque et des moustaches barrés de bleu-vert et de bleu brillant.

Joues rousses

Menton et gorge blanc teinté de chamois jaunâtre.

Poitrine rousse orangé

Ailes bleu-vertes

Dos bleu avec une grande trace bleu vif et brillant.

Bec noir avec les commissures rouges

Pattes rouges

Yeux foncés



Vol :

Vol acrobatique, rapide, direct à 40-45 km/h. Longe souvent les cours d'eau au ras de l'eau.

Famille : Alcedinidés

Taille : 16 à 17 cm

Envergure : 24 à 26 cm

Poids : 40 à 45 g

Longévité : 15 ans

Alimentation :

L'essentiel du menu du martin-pêcheur est composé de petits poissons tels que les vairons, épinoches, chabots, truites, vandoises, chevaines, perches, brochets et loches franches jusqu'à 125 mm. L'oiseau guette ses proies d'un perchoir n'excédant pas trois mètres. Ou bien il pratique le vol stationnaire. La proie repérée, il plonge presque verticalement, les ailes allongées vers l'arrière. Le martin-pêcheur consomme également des insectes (des notonectes) ainsi que des crustacés (des gammarès) et des batraciens.

Habitat :

Le martin-pêcheur se rencontre au bord des eaux calmes, propres et peu profondes, plutôt en des lieux abrités du vent et des vagues. Il doit disposer d'une eau pure et poissonneuse. Les rives, pourvues d'arbres et de poteaux utilisés comme des perchoirs sont appréciées. L'eau doit rester assez claire pour un bon repérage des proies. En hiver, on les observe sur les côtes et dans les estuaires où ils fuient le gel des eaux douces.

Nidification :

Les martins nichent dans un terrier creusé habituellement dans la berge d'un cours d'eau. Le femelle pond six à sept œufs. Les deux adultes couvent à tour de rôle et nourrissent les jeunes qui naissent nus. Au bout de 4 semaines environ, les petits quittent le nid et sont rapidement aptes à se nourrir seuls. La ponte intervient d'avril à juillet. Sur cette assez longue période, un couple peut mener à terme 2 ou 3 couvées.